

chenille →

photo ©Henri Thewissen



Le Sphinx du chêne

Marumba quercus (Denis et Schiffermüller, 1775)
Lepidoptera (Lépidoptères) Sphingidae

La chenille de ce papillon de nuit se développe sur les chênes ; d'abord d'un vert jaune, elle passe au vert bleu au fur et à mesure des mues, avec des traits blancs obliques et une corne bien caractéristique des chenilles de cette famille des Sphinx. Elle s'accroche aux feuilles surtout par ses fausses-pattes à l'arrière.

Une fois la croissance terminée, la chenille au dernier stade se dirige vers le sol où elle construit une logette et c'est dans celle-ci qu'elle se transforme en chrysalide et qu'elle passe l'hiver.

Le papillon émerge à partir de mai ; c'est un grand papillon (envergure pouvant atteindre une dizaine de cm chez la femelle) qui vole aux abords des chênes, en bordure de forêt et dans les jardins. Comme chez tous les papillons de nuit (ou hétérocères), on reconnaît le mâle à ses antennes pectinées et on confirme la famille (Sphingidae ou sphinx) par le fait que les antennes se terminent par un petit crochet.

L'accouplement a lieu peu de temps après l'émergence et ensuite la femelle pond des œufs verts sous les feuilles de chêne.



photo ©Daniel Drouard ↑ prise à Champtercier (04)



photo ©Richard Fay ↑ prise à Cruis (04)