



Le Brun des pélargoniums

Cacyreus marshalli Butler, 1898

Lepidoptera (lépidoptères) Lycaenidae (lycènes)



← photo ©Françoise Drouard

Voici une espèce originaire d'Afrique du sud qui a été importée en Europe avec les pélargoniums cultivés – appelés couramment géraniums – qui ornent les jardinières (par exemple à Mallefougasse, tout autour de l'église). Cette introduction involontaire a été remarquée d'abord aux Baléares en 1989 et de là l'espèce a gagné l'Espagne, puis la France par les Pyrénées en 1997. Elle est maintenant partout où on a des géraniums d'ornement.

C'est un petit papillon diurne qu'on repère bien au printemps et en été au-dessus des géraniums en pots, la femelle pondant ses œufs dans les tissus de la plante ou sur les fleurs en boutons. Les chenilles ont d'abord une vie dans la plante ; elles sortent au stade 3 et au stade 4 on peut les repérer grignotant les feuilles et les fleurs en bouton.

← œuf sur une fleur en bouton

photo ©Françoise Drouard

C'est donc une espèce considérée comme invasive et donc a priori non appréciée, car en cas de forte présence, les géraniums en pot dépérissent et donnent moins de fleurs. Mais s'il n'y a que peu de dégâts, il faut profiter de ce papillon très mignon et lui pardonner les trous faits par les chenilles.

← papillon sur les feuilles perforées par les chenilles

photo ©Françoise Drouard prise à Champtercier (04)

Au cas où on voudrait limiter la propagation, il faut surveiller la plante, enlever les boutons floraux qui se flétrissent car ils sont attaqués et enfin retirer les chenilles quand elles sortent.



← papillon – chenille ↑

photos ©Françoise Drouard

