



↑ capitule fleuri et feuilles caulinaires
← tige fleurie
↓ capitules



La Centaurée à panicule

Centaurea paniculata L. 1753

subsp. *paniculata*

Phanerophyta (plantes à fleurs)

Asteraceae (astéracées = composées)

Voici une plante qu'on trouve souvent dans les pelouses sèches, les lieux piétinés, la garrigue, les friches, les talus... Son caractère xérophile est net ; ses exigences concernant le sol sont réduites, elle s'accommode de tous les terrains et on la trouve à toutes les altitudes de la commune.

Elle est précieuse pour les insectes butineurs car elle fleurit tout l'été, même sous le soleil ardent d'août alors que beaucoup de plantes autour d'elle sont défleuries.

Ses fleurs purpurines sont en capitules solitaires, au bout de tiges dressées très ramifiées, pouvant atteindre 70 cm.

[photos Françoise Drouard]

L'involucre à la base du capitule est de forme oblongue, rétréci à la base ; il est formé de bractées foliacées, vertes plus ou moins brunies et qui se termine par une partie apicale blanchâtre ou brunâtre avec des cils sur les côtés et une pointe médiane.

Les feuilles sont vert grisâtre car couvertes de petits poils ; les basales sont bien développées, les caulinaires plus petites, toutes sont pennatiséquées (divisées en lobes étroits de part et d'autre de l'axe).