

Thorax en patte de chat



Thorax en M



Thorax noir



## La Coccinelle asiatique

*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)  
 Insecta (insectes) Coleoptera (coléoptères)  
 Coccinellidae (coccinelles)

Comme on peut le voir sur les photos, c'est une espèce assez variable ; on la reconnaît par son assez grande taille (5-8 mm adulte), par le fait aussi que le thorax appartient à l'un des trois types suivants :

- en patte de chat (5 petites taches noires médianes parfois fusionnées sur fond blanc),
- en M (2 grandes taches noires parfois fusionnées),
- une seule plage noire occupant tout le centre (à comparer avec les taches sur le thorax de l'espèce *Coccinella septempunctata* – voir fiche).

De plus elle a les pattes rougeâtres.

Sur une fleur de chèvrefeuille pleine de pucerons →

On l'appelle coccinelle asiatique car elle est originaire d'Asie et a été volontairement introduite en Europe sous couvert de lutte biologique car c'est une grande dévoreuse de pucerons. Mais les coccinelles indigènes dévorent tout autant les pucerons et ce sont en fait des raisons mercantiles (la coccinelle asiatique coûte moins cher à élever) qui justifient sa commercialisation ! Elle s'est révélée invasive, s'adaptant très bien dans tous les milieux et concurrençant les espèces indigènes pour l'espace et la nourriture, mais les attaquant aussi directement en mangeant leurs larves.

Larve →

La larve est reconnaissable, noire à bandes latérales rouge orangé (et non des taches comme la Coccinelle à sept points).



Photos © Françoise Drouard