photos ©Françoise Drouard

La Cétoine dorée

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
Coleopterae (coléoptères) Scarabeidae (scarabées) Cetoninae (cétoines)

Les adultes fourragent les fleurs par temps ensoleillé, de mai à juillet. On les remarque facilement, vue leur taille (1,5 à 2 cm) et la belle couleur de leurs élytres, le plus souvent vert métallique, avec de petites taches blanches allongées transversales et disposées symétriquement dans la partie postérieure des deux élytres. En fait leur couleur est variable, du vert au rouge cuivreux, au bronze et au bleu noir. Le dessus est toujours métallisé, avec très peu de poils. Le dessous lui est bien velu et on remarque une saillie à tête globuleuse caractéristique entre les deux pattes moyennes.
On appelle parfois cette cétoine « hanneton des roses » cependant, au jardin, elle ne fréquente pas seulement les rosiers, mais aussi troène, lilas, pyracantha… dans la nature, on la trouve sur les églantiers, l'aubépine, les chardons, les ombellifères…
Elle vole facilement (mais les élytres restent fermés en vol, simplement un peu soulevés pour laisser passer les ailes !)

Les larves se trouvent au sol, dans le compost, dans les tas de feuilles, le terreau, le bois décomposé ; elles ressemblent à celles du hanneton (ou ver blanc) mais le jardinier ne doit pas les confondre : en effet, si la larve du hanneton coupe les racines des plantes et pour cela n'est pas très appréciée, celle de la cétoine dorée participe à la formation du compost en se nourrissant de matière organique végétale en décomposition et, de ce fait, est une alliée objective du jardinier (qui pardonnera à l'adulte d'aimer les roses).
Pour distinguer ces deux larves melolonthoïdes(c'est-à-dire comme celle du hanneton commun), sachez que le ver blanc a « une grosse tête et un petit derrière », alors que la larve de cétoine dorée a « une petite tête et un gros derrière » !
La nymphe qui termine la métamorphose de l'insecte est dans une logette terreuse ; l'adulte en émerge en fin d'été et hiverne puis démarre son activité au printemps suivant.