



↑ Clairon des abeilles

Les Clairons

Clairon des abeilles : *Trichodes alvearius* (Fabricius, 1792)

Clairon des ruches : *Trichodes apiarius* (Linnaeus, 1758)

Clairon à épaulette : *Trichodes leucopsideus* (Olivier, 1800)

Voici trois coléoptères d'1 cm environ en longueur qu'on trouve sur les fleurs en été. Ils ont la même forme allongée, les pattes, les antennes, la tête et le thorax noirs et deux élytres à bandes transversales rouges et noires ; tête, thorax et pattes sont bien velus

Pour les distinguer, il faut regarder la première bande au niveau des épaules et le bout des élytres :

espèce	bande rouge aux épaules	bout des élytres
<i>alvearius</i>	oblique	rouge
<i>apiatus</i>	droite	noir
<i>leucopsideus</i>	droite avec un point noir	noir

Les adultes sont opportunistes et carnassiers : si on les voit le plus souvent s'intéresser aux fleurs, ils peuvent aussi attraper un insecte si l'occasion se présente.

Quant aux larves, elles dévorent les œufs, les larves et les nymphes d'hyménoptères (abeilles sauvages ou abeilles domestiques).

Les œufs sont pondus sur les fleurs et les larves qui éclosent attendent le passage d'une abeille qui vient butiner et s'accrochent à elle pour être transportée dans un nid ou une ruche.

Coleoptera (coléoptères) Cleridae (clérides)

↓ Clairon des ruches



↑ Clairon à épaulette

photos ©Françoise Drouard