



La Tourterelle turque

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1836)
Aves (oiseaux) Columbidae (colombins)



Photo d'Anfrx sur Wikipedia – licence CC

La période de nidification s'étend de février à septembre. Le nid est assez sommaire, construit en général dans un arbre, avec des branchages disposés en plateforme. La femelle pond deux œufs qui sont couvés pendant deux semaines et les oisillons sont élevés pendant un mois ; plusieurs pontes peuvent se succéder pendant la période de reproduction.

Et c'est pendant cette période de l'année que le roucoulement caractéristique se fait entendre de manière monotone et entêtante dans la journée.

C'est un oiseau voisin des pigeons qu'on reconnaît à la coloration gris rosé de son plumage, à son collier noir interrompu à l'avant, au bout noirâtre de ses ailes rémiges primaires et à ses pattes rougeâtres.

L'espèce est sédentaire dans les villages, profitant des graines distribuées aux poules et aux oiseaux des jardins, mais elle mange aussi baies, bourgeons et jeunes feuilles. Elle est arrivée en France dans les années 1950, après avoir colonisé toute l'Europe de l'Ouest à partir de la Turquie, au début du XXème siècle.

Elle vit en petites troupes l'hiver, en couple du printemps à l'automne. Les juvéniles ressemblent aux adultes mais n'ont pas de collier. Ils sont adultes au bout d'un an.

Elle a un vol direct rapide avec force battements d'ailes énergiques mais elle peut aussi planer. Elle vient souvent à terre pour se nourrir et ne se montre pas particulièrement farouche.

Cette espèce fait partie des espèces que l'on peut chasser (petit gibier) mais heureusement il est interdit de tirer en direction des habitations, des routes, chemins... et comme cette espèce vit dans le village, elle est peu en danger.